

15.07.2020,



SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI  
DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL

Nr. 5931, 5932, 5933, 5934, 5935, 5936, 5937, 5938, 5939, 5940, 5941, 5942,  
5943, 5944, 5945, 5946, 5947, 5948, 5949, 5950, 5951, 5952, 5953, 5956,  
5957, 5928, 5959, 5960, 5961, 5962, 5994, 5995, 5996, 5954, 5955 /2020

**Către: Domnul Cristian BUICAN  
Secretar al Camerei Deputaților**

**Ref. la: Răspunsuri la întrebări formulate de deputați**

**Stimate domnule secretar,**

Vă transmitem, alăturat, răspunsurile instituțiilor vizate cu privire la unele întrebări formulate de deputați, potrivit tabelului anexat.

Cu deosebită considerație,

**NINI SĂPUNARU**

**SECRETAR DE STAT**



ROMÂNIA  
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
CABINET SECRETAR DE STAT

-10343A-

Nr. NT 2532 / 14.08.2020

Stimată doamnă deputat,

Nr. 5345 / M.R.P.  
Data 14.08.2020

Referitor la întrebarea/interpelarea dvs. privind "Testarea farmaciștilor și asistenților de farmacie", vă comunicăm următoarele:

Testarea personalului medico-sanitar și auxiliar este deja prevăzută în Metodologia de supraveghere a COVID -19 aflată pe site-ul INSP-CNSCBT [www.cnscbt.ro](http://www.cnscbt.ro), în capitolul "Recomandări de prioritizare a testării pentru COVID -19", la pct. 1.: "Persoanele simptomatice, inclusiv personalul medico-sanitar conform definiției de caz"

Recomandările Institutului Național de Sănătate este de a nu testa personalul medico-sanitar și auxiliar asimptomatic, pentru că acesta trebuie să aplice Precauțiile Standard pentru toți pacienții, precum și Precauțiile Specifice pentru transmiterea aeriană, prin picături și prin contact pentru cazurile suspectate de COVID -19- pe site-ul Colegiului Farmaciștilor din România <https://www.colegfarm.ro/userfiles/file/GHID%20orientativ%20de%20adaptare%20a%20practicii%20farmaceutice%20C3%AE%20cursul%20pandemiei%20COVID-19.pdf> se găsește Ghidul orientativ de adaptarea a practicii farmaceutice în cursul pandemiei COVID-19 care cuprinde

Măsuri privind personalul:

- Impunerea distanței de minim 2 m între farmacist/asistent de farmacie și pacienți, precum și între membrii echipei din farmacie;
- Scurtarea timpului de contact dintre farmacist/asistent de farmacie și pacient (discuție-eliberare);
- Este obligatorie purtarea echipamentului de protecție (halat, măști și mănuși, bonete), iar dacă sunt disponibile, pe deasupra se vor îmbrăca halate speciale de unică folosință, șorțuri de polietilenă impermeabile, vizieră de protecție a feței sau ochelari;
- Schimbarea măștilor se face la minim două ore sau ori de câte ori devin inutilizabile. Dacă o mască a fost scoasă, nu se refolosește. Aruncarea măștilor și mănușilor se face în recipiente speciale pentru colectarea materialelor posibil infectate, care se preiau de către firme specializate;
- Instruirea personalului cu privire la măsurile de igienă: pus-scos masca, evitat fața, hainele, prindere păr, spălare ochelari, dezinfectare suprafețe, telefon, vorbit preferabil la speaker și căști;
- Instruirea personalului să vegheze reciproc cu privire la gesturi posibil contaminante (gesturi precum dusul mâinii la gură, băut, fumat, manevrat masca, scărpinat, atinsul părului, pixului, brichetei);

Str. Cristian Popișteanu nr.1-3, Sector 1, Cod 010024; BUCUREȘTI, ROMÂNIA,

Tel. (+4-021)3072502; Fax (+4-021)313.98.41



**ROMÂNIA**  
**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII**  
**CABINET SECRETAR DE STAT**

- Dezinfectarea mânușilor cu substanțe dezinfectante după fiecare atingere a banilor, sau oricărui obiect posibil contaminat;
  - Dezinfectarea frecventă a suprafețelor (masă, pardoseli, mobilier), obiectelor personale (telefon, chei de mașină, chei de acces, bricheta), îmbibarea preșului de la intrare cu soluție dezinfectantă;
  - Instruit și dotat personalul pentru a se proteja atât în farmacie, cât și în comunitate/familie (când ajunge acasă să treacă printr-un proces de decontaminare care să includă spălarea zilnică a hainelor cu care au venit de afară, ștergerea tălpilor încălțăminteii, separarea zonei de intrare în casă, posibil contaminată, de zona curată);
  - Medicamentele și banii vor fi date direct în mână, în etape, fără atingere cu pacientul. Cu o mână vor fi înmânate medicamentele, cu cealaltă, manipulați banii, iar după acordarea restului, se dezinfectează mânușile. Alternativ se pot delimita pe masa de lucru/tejghea/counter două zone distincte, semnalizate vizual clar pentru pacienți, una pentru bani și bon, iar alta pentru medicamente. După fiecare manipulare a banilor mânușile vor fi dezinfectate. Apăsarea dispenser-ului cu soluție dezinfectantă se va face cu cotul, nu cu mâna mănușa posibil contaminată;
  - Separarea turelor personalului, să nu se intersecteze, acolo unde este posibil;
  - Pentru a proteja personalul și următorii pacienți, în cazul unui pacient posibil pozitiv, după trecerea lui se întrerupe activitatea și se efectuează o procedură completă de dezinfectare (suprafețe, pardoseli, lampă UV). „
- Având în vedere că farmacistul este prim și ultim filtru în sistemul medical, îi revine un rol determinant în această pandemie. Farmaciștii trebuie să ia măsuri suplimentare pentru protecția lor, a familiilor proprii și a comunității. Toți pacienții vor fi considerați posibil COVID pozitivi, dar trebuie să li se ofere aceleași servicii și aceeași grijă ca și până acum. Ghidul recomandă implementarea în farmacii a prezentelor proceduri, care au ca scop limitarea expunerii personalului și pacienților.

Cu deosebită considerație,

**SECRETAR DE STAT**  
**NICOLAE DRĂGOȘ GAROFIL**

**Camera Deputaților**  
**Doamnei deputat Georgeta-Carmen Holban**

*Str. Cristian Popișteanu nr.1-3, Sector 1, Cod 010024; BUCUREȘTI, ROMÂNIA,*

*Tel. (+4-021)3072502; Fax (+4-021)313.98.41*